



WAR CG notulen avatrombopag (Doptelet®)

avatrombopag (Doptelet®), eerste bespreking

24 april 2021

FT-rapport

De beoordelaar vat het FT-rapport samen. Avatrombopag wordt toegepast bij de behandeling van primaire chronische immuuntrombocytopenie (ITP) bij volwassen patiënten die resistent zijn tegen andere behandelingen. Daarnaast is avatrombopag geïndiceerd voor de behandeling van ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure. Voor beide indicaties wordt vergoeding aangevraagd.

Het Zorginstituut komt tot de eindconclusie dat avatrombopag voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk bij de behandeling van ITP. Het heeft een gelijke waarde ten opzichte van eltrombopag. Avatrombopag heeft bij de behandeling van ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure een meerwaarde ten opzichte van placebo. Er kan geen conclusie worden getrokken over de relatieve effectiviteit van avatrombopag ten opzichte van profylactische trombocytentransfusie.

Referenten

- De referenten kunnen zich vinden in de eindconclusies wat betreft beide toepassingen van avatrombopag. Het is echter jammer dat geen conclusie kon worden getrokken over de relatieve effectiviteit wat betreft de leveraandoening. De beoordelaar geeft aan dat avatrombopag waarschijnlijk goedkoper is dan profylactische trombocytentransfusie. Avatrombopag wordt maar vijf dagen toegediend, bij profylactische trombocytentransfusie (kostbaar product) is ziekenhuisopname noodzakelijk. Een directe vergelijking is lastig, ook omdat over het effect van profylactische trombocytentransfusie te weinig bekend is;
- In het rapport dient te worden verduidelijkt waarom een vergelijking is gemaakt met eltrombopag, en niet met romiplostim. In de inleiding wordt romiplostim wel vermeld als middel dat in het GVS is opgenomen. Eltrombopag is eerder met romiplostim vergeleken. De middelen kunnen echter niet geclusterd worden. Een en ander zal alsnog ter verheldering aan het rapport worden toegevoegd.

Discussie

- Op pagina 9, onderaan, is een dubbeling in de tekst opgenomen;
- Op pagina 12 staat dat de prevalentie van ernstige trombocytopenie 1% van de cirrosepatiënten betreft, zijnde ongeveer 78 patiënten op basis van de data. Dat aantal kan niet kloppen. De beoordelaar zoekt dit na;
- De WAR kan zich vinden in de eindconclusie.

De beoordelaar verwerkt de opmerkingen van de WAR in het rapport.